

Respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva

Cargo: S22 - MÉDICO CLÍNICO GERAL - 40H

Disciplina: Conhecimentos Específicos-Conhecimentos na Área de Formação

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
44 - T / 37 - V / 39 - W	Não. O procedimento é experimental na situação descrita e não poderia ser realizado fora do ambiente de pesquisa, após aprovação por um Comitê de Ética em Pesquisa.	Realmente, no final de 2017, o CFM conselho federal de medicina juntamente com a sociedade de brasileira de cirurgia bariátrica e metabologia aprovaram a cirurgia bariátrica para tratamento de diabetes, porém não com IMC < 30. Esses casos de IMC entre 25 e 30, se mantêm o caráter experimental. A indicação de correção metabólica devido ao diabetes se mantêm, ficando apenas a definir qual o índice de massa corporal liberado para o procedimento. – Visto que o procedimento não possui indicação formal, devendo ser considerado como experimental e, portanto, seguir normas do conselho federal de medicina.	Indeferido	-

PREFEITURA DE JARU / RO

Respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva

Página 2 de 2

Cargo: S22 - MÉDICO CLÍNICO GERAL - 40H

Disciplina: Conhecimentos Específicos-Conhecimentos na Área de Formação

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
52 - T	Preparação para tratamento com iodorradioativo	Está claro que a paciente se encontra em tratamento com drogas antitireoideanas há dois anos e se mantém tóxica, o que configura falha terapêutica (12 a 24 meses). Dessa forma, está indicada tratamento definitivo, preferencialmente Iodo Radioativo	INDEFERIDO	-
58 - T	O paciente é diabético	Apesar de apenas uma glicemia, não há na questão nenhuma glicemia que o torne intolerante, ou seja entre 100 e 125, então a melhor resposta é que o paciente é diabético , uma vez que a glicemia se encontra maior ou igual a 126	INDEFERIDO	-
59 - T	Colchicine	Está claro no comando da questão que é para marcar a melhor resposta. Nesse caso, uma vez não se tendo nas opções antiinflamatório não hormonal e sabendo que o corticóide deve ser usado apenas nas falhas terapêuticas , fica evidente ser a colchicine a melhor resposta exatamente pela rapidez de resposta analgésica, a despeito dos possíveis efeitos colaterais	INDEFERIDO	-
60 - T	piperacilina com tazobactam	O caso em questão mostra um idoso, grave, com doença recorrente, várias internações anteriores e uso recente de outros antibióticos. Fica clara a necessidade de cobrir germes mais potentes que aparecem como consequência ao uso com frequência de antibióticos anti-pneumococo, como a pseudomonas. Sendo assim a indicação antibiótica está correta , mesmo o paciente não estando explicitamente no CTI.	INDEFERIDO	-