

Respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva

Cargo: S28 - MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA - 40H

Disciplina: Conhecimentos Específicos-Conhecimentos na Área de Formação

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
46 - T / 53 - V / 60 - W	agonista beta adrenérgico, bloqueador de canal de cálcio e antagonista de receptor da ocitocina.	As drogas uterolíticas são utilizadas para inibir o TPP há quase 50 anos. Durante todos esses anos, apenas duas drogas foram desenvolvidas especialmente para esse fim: a ritodrina (agonista beta-adrenérgico) e o atosiban (antagonista do receptor de ocitocina). As outras drogas foram adaptadas para a tocolise. Atualmente, há três tipos de uterolíticos mais utilizados: agonistas beta-adrenérgicos, bloqueadores do canal de cálcio e antagonistas do receptor de ocitocina. Outras drogas também utilizadas para inibir o TPP (sulfato de magnésio, inibidores de prostaglandinas e doadores de óxido nítrico) carecem de comprovação quanto à sua eficácia ou são responsáveis por efeitos colaterais importantes.	INDEFERIDO	-
47 - T / 59 - V / 52 - W	repetir mensalmente e ultrassonografia com doppler fetal	Na resposta do gabarito oficial já está a realização do exame (COOMBS) mensalmente. Para, portanto, acompanhar a titulação bem como avaliar com o doppler a evolução do feto.	INDEFERIDO	-
50 - T / 57 - V / 58 - W	sulfato ferroso.	Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a resposta correta da questão é a alternativa D, e não C, conforme gabarito.	DEFERIDO	Troca para D
51 - T / 58 - V / 56 - W	exame sendo negativo, deve ser repetido mensalmente verificar soroconversão		INDEFERIDO	-
52 - T / 49 - V / 55 - W	hidralazina.	Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a resposta correta da questão é a alternativa B, e não A, conforme gabarito.	DEFERIDO	Troca para B

